

Опыт применения препарата Гептронг в реабилитации больных после лучевой и химиотерапии.

Ломазова Елена Владимировна, к.м.н., ФМБА России
Гиндин Семен Юрьевич, д.м.н., ООО КсеалМед, С-Пб

Комплексное лечение онкологических пациентов

1. Хирургические методики
2. Лучевая и химиотерапия
3. Иммуноterapia
4. Фармакологическая реабилитация

Обсуждение результатов применения
лекарственного препарата Гептронг:
клинический случай
пациент А74 (1974 г.р.)
Период наблюдений : 2015 -2019 г.г.

Февраль 2015 г.

Диагностировано новообразование кишечника с метастазированием

30.03.2015 г.

- Хирургические методики: колоноректальный стент в сигмовидную кишку;
- Химиотерапия : 3 курса, 1-я линия по схеме FOLFOX;

12.05.2015 г.

- Хирургические методики: экстренно оперирована (перфорация сигмовидной кишки) операция Гартмана, двусторонняя тубовариэктомия, оментэктомия.
- Диагностирована раковая кахексия: вес пациентки 37 кг при росте 174 см, симптомы астении, адинамии, признаки гиповитаминоза, субдепрессивное состояние.

С целью фармакологической коррекции кахексии применялся препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно, в течении 10 дней (курс 300 мл). Проведено 2 курса (июнь, июль 2015 г.).

Сентябрь 2015 г.

- У пациентки выявлено прогрессирование метастазов в легкие.

13.10.2015 г. - 28.03.2015 г.

- Химиотерапия: 12 курсов 2-ая линия, по схеме FOLFOX + Авастатин.


Фармакологическая реабилитация :

**Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно,
в течении 10 дней (курс 300 мл),
после каждого курса химиотерапии (12 курсов).**

Пациент А74 (1974 г.р.)

В период с мая по сентябрь 2015 г. было проведено 2 курса терапии лекарственным препаратом Гептронг (600 мл), с целью фармакологической коррекции кахексии. В сентябре 2015 г. вес пациентки составлял 55 кг.

Динамика показателей веса на фоне этиотропного лечения за период май-сентябрь 2015 г.



12. 05. 2016 г.

-Хирургические методики : Восстановление непрерывности толстой кишки с превентивной трансверзостомией, удаление метастазов культи большого сальника, экстирпация матки без придатков.

20. 05. 2016 - 20. 01. 2017 г.

- Химиотерапия : 3-я линия Капецитабин - 2000 мг/м² в монорежиме.

**Фармакологическая реабилитация :
Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно,
в течении 10 дней (курс 300 мл), 1 раз в месяц.**

27. 07. 2016 г.

- Хирургические методики : Операция по закрытию трансверзостомии с формированием ручного анастомоза по типу бок в бок.


26. 12. 2016 г.

- Выявлено прогрессирование метастазирования в легких.
- химиотерапия : 12 курсов 4-я линия TAS-102.

Фармакологическая реабилитация :

Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно, в течении 10 дней (курс 300 мл), 1 раз в месяц.

Динамика биохимических показателей крови (Hgb) г/л



03.2018 г.

Химиотерапия : Начат курс XELOX + Бевацизумаб

Фармакологическая реабилитация :

**Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно,
в течении 10 дней (курс 300 мл), 1 раз в месяц.**

Динамика биохимических показателей крови (2015 г.)

Показатели	февраль	апрель	ноябрь	декабрь
Гемоглобин	83	119	137	151
Эритроциты	4,40	4.71	4,64	5,09
Лейкоциты	10,46	5,05	2.98	4,68
Тромбоциты	893	509	303	339
Лимфоциты	12	-	45	50
Нейтрофилы	-	-	41	36,3

Динамика биохимических показателей крови (2016 г.)

Показатели	февраль	апрель	ноябрь	декабрь
Гемоглобин	157	152	147	143
Эритроциты	5,14	4,96	4,78	4,42
Лейкоциты	3,62	6,47	5,06	4,54
Тромбоциты	270	249	284	318
Лимфоциты	50,3	23,6	37,5	37,2
Нейтрофилы	38,4	62,3	46,3	45,4

Динамика биохимических показателей крови (2018 г.)

Показатели	март	апрель
Гемоглобин	141	137
Эритроциты	4,46	4,23
Лейкоциты	5,25	3,66
Тромбоциты	346	167
Лимфоциты	20,6	40,2
Нейтрофилы	60,7	37,4

**В настоящее время:
Химиотерапия продолжается.
Общее состояние удовлетворительное.
Режим сна, питания без особенностей.
Вес пациентки 68 кг
(при росте 174 см).**

Обсуждение результатов применения
лекарственного препарата Гептронг:
клинический случай
пациент Б68 (1968 г.р.)
Период наблюдений : 2011 -2019 г.г.

2011 г.

-Хирургические методики:

Мастэктомия по поводу мультифокальной бластомы правой молочной железы (pT2N1M0)

- Химиотерапия 5 курсов ПХТ по схеме FDC

- Лучевая терапия

- Гормонотерапия, Тамоксифен 20 мг/сутки на протяжении пяти лет

Фармакологическая реабилитация :

**Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно,
в течении 10 дней (курс 300 мл), 1 раз в месяц.**

2016

- Хирургические методики: Лапаротомия по Черни. Расширенная пангистерэктомия с придатками обеих сторон тазово-обтураторная лимфодиссекция по Вертгейму-Мэйгсу, гистологически не подтверждена злокачественность процесса в слизистой матки.

Фармакологическая реабилитация :

Лекарственный препарат Гептронг по схеме: 3 мл в/м, ежедневно в послеоперационный период, с последующим курсом (300 мл) в течении 10 дней. 1 курс раз в 6 месяцев.

Выводы:

Применение фармакологической реабилитации онкологических пациентов с помощью препарата Гептронг:

- значительно, а иногда и полностью снимает побочные эффекты от лучевой и полихимиотерапии (купирование синдрома тошноты и рвоты, отсутствие аппетита, потеря веса);
- благотворно влияет на гемопоэз, нормализуя генерацию гемоглобина, лейкоцитов, периферическую и центральную гемодинамику;
- положительным образом влияет на физическую работоспособность и значимо улучшает качество жизни онкологических пациентов;
- ускоряет возвращение пациента к социальной активности.

A close-up photograph of two people in medical attire shaking hands. The person on the left is wearing light blue scrubs and has a stethoscope around their neck. The person on the right is wearing a white lab coat. The background is bright and out of focus. The text "БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ" is overlaid in the center in blue with a white outline.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ